

L'ÉLEVAGE DE POULET DE CHAIR À CROISSANCE RAPIDE

I. Démarrage de l'élevage

1. Nettoyage et Désinfection du Bâtiment d'Élevage (poulailler)

Dans tous les élevages de poulet de chair, les cycles sont espacés de 10 à 18 jours de « vide sanitaire », durant cette période critique, l'éleveur doit réaliser le nettoyage et la désinfection du bâtiment et de tous les équipements pour faire baisser la charge microbienne à un niveau très faible.

2. Réception et installation des poussins âgés de 1jour

Après leurs éclosions (au sein des couvoirs industriels), et pendant les premiers jours de leurs âges, les poussins vivent une période relativement délicate, qui suppose beaucoup de présence, de soins et d'attention de la part de l'éleveur.

3. Les conditions d'ambiance au sein du bâtiment d'élevage

Le chauffage est indispensable. Au démarrage, le poussin n'est pas encore emplumé, il est seulement recouvert de duvets, et est sensible aux coups de froid.

4. Les Abreuvoirs et les Mangeoires

LES ABREUVOIRS doivent être répartis en cercle autour du radiant (figure 2) afin que les poussins ne s'éloignent pas de la source de chaleur pour boire de l'eau qui doit être potable et à la T° du poulailler.

Abreuvoir siphoné 1^{er} âge : de 3 litres (1 / 30 sujets)

Abreuvoir siphoné 2^{ème} âge : de 5-10 litres (1 / 25 sujets)

Abreuvoir siphoné 3^{ème} âge : de 10-20 litres (1 / 20 sujets)

LES MANGEOIRES utilisées pour le démarrage sont disposées en étoile sous le radiant (figure 2) afin de permettre aux poussins de se déplacer en fonction de leur besoin en chaleur.



Figure 3. Assiettes de démarrage



Figure 4. Mangeoires 1^{er} âge (2^{ème} - 4^{ème} semaine)

L'ÉLEVAGE DE POULES PONDEUSES

Pour un cycle de 80 semaines : 20 semaines d'élevage et 60 semaines de production. L'élevage des poules pour la production d'œufs se subdivise en deux périodes : POULETTE et PONDEUSE.

I. LE STADE « POULETTE » (1^j - 4 jusqu'au 5^{ème} mois)

1. Démarrage des Poussins « Futurs pondeuses » (1^{er} j - 4 semaines)

Les poussins « PONTE » sont plus petits que les poussins « CHAIR ». Il est possible aussi de démarrer l'élevage avec des poulettes de 6 semaines (appelées poulettes démarrées) pour éviter une structure d'élevage de poussins plus fragiles et nécessitant de soins particuliers.

2. Croissance des poulettes (5-18 semaines)

3. **Normes d'élevage** (Abreuvoirs, Mangeoires et Litière) : le respect des normes de densité et de matériel permet d'obtenir un lot homogène.

4. Le débécquage (épointage)

Le débécquage ou épointage est une opération qui consiste à couper l'extrémité du bec des volailles à l'aide d'un appareil appelé débécqueur.

5. Prévention des coccidioses

Un anticoccidien doit être obligatoirement incorporé aux aliments jusqu'à l'âge de 14 semaines (3,5 mois). Après, la poulette peut développer sa propre immunité contre les coccidies. Le retrait de l'anticoccidien autorise le développement de cette immunité.

II. LE STADE « PONDEUSE » (18-72 SEMAINES jusqu'à LA REFORME)

1. PONDOIRS ET PERCHOIRS

Les pondoirs et perchoirs sont deux accessoires pour poulailler, souvent en bois, dont les rôles sont bien distincts et qui contribuent au bien-être des poules. Ainsi se mettre sur un

perchoir poulailler bois constitue un instinct naturel pour les poules. Un perchoir les aide à se protéger des prédateurs surtout si le poulailler est installé directement sur le sol. Le perchoir dans le poulailler permettra ainsi aux poules d'avoir une meilleure protection.

2. PROGRAMME LUMINEUX

A l'entrée en ponte, il est nécessaire de commencer par une stimulation (minimum 1,5 kg pour les souches rouges et 3,3 kg pour les souches blanches) : une demi-heure (1/2h) de plus par jour pendant une semaine, puis on augmente d'une demi-heure (1/2h) chaque semaine pendant 6 semaines pour atteindre 16 heures de lumière au total (12 h de lumière naturelle plus 4 h de lumière artificielle).